


Gróðurkort af Akureyri og nágrenni

- Kortlagning hófst í ágúst 2009
- Verður lokið sumarið 2010
- Staffæring gagna stendur yfir
- Frumkort tilbúið fyrir vorið 2010
- Lokaskýrsla og kort fyrir árslok 2010

Staða staffæringar 26. nóv. 2009





Gróðurkortlagning Hríseyjar 2007

Rannveig Thoroddsen, Guðmundur Guðjónsson
og Borgþór Magnússon

Unnið fyrir Akureyrarbæ



Forsaga

- Fundað með umhverfisnefnd Akureyrar 2006 vegna lúpínu og kerfils í Hrísey
- Tillaga um gróðurkortlagningu eyjarinnar til að taka út ástand og meta þróun
- Samningur gerður og kortlagning fer fram í sept. 2007
- Frumniðurstöður kynntar 2008
- Skýrslu lokið og skilað í nóvember 2009

Kortlagning og greining af Hrísey


- 1976 á svarthvítar loftmyndir 1:36.000, kort ekki gefið út
- Litloftmynd frá 1998
- 2004 Spot gervitunglamynd



Hrísey 1998

Loftmynd

Hrísey 2004
innrauð Spot-mynd



Kortlagning 2007

- Lágflugsmyndir teknar af Loftmyndum ehf. í lok júlí fyrir Akureyrarbæ
- Upprétt myndkort
- Gróðurkortlagning unnin á myndkort

Gróðurkort 2007



1. tafla. Flatarmál gróðurlenda og landgerða í Hrísey haustið 2007.

Gróðursamfélag Gróðurlendi	ha	km ²	% af eyju
Mólendi	358	3,58	48
Lyngmói (B)	330	3,30	44
Víðimói og kjarr (D)	8	0,08	1
Þursaskeggsmói (E)	15	0,15	2
Fléttumói (J)	5	0,05	1
Gras- og blómlendi	206	2,06	28
Graslendi (H)	116	1,16	16
Blómlendi (L)	<1	<0,01	<1
Hávaxnar og breiðumyndandi tegundir (L3-L5-L6)	90	0,90	12
Ræktað land	67	0,67	9
Garðlönd, tún og uppgræðsla með grösum (R1-R5)	39	0,39	5
Skógrækt (R6)	27	0,27	4
Votlendi	29	0,29	4
Deiglendi (T)	6	0,06	1
Mýri (U)	15	0,15	2
Flói (V)	7	0,07	1
Samtals gróíð land	660	6,60	89
Landgerð (lítt eða ógróíð land)			
Byggð, önnur mannvirki og rask (by, n, ra)	31	0,31	4
Annað lítt eða ógróíð land (fl, fj, gr, me, mo, sk)	51	0,51	7
Vatn/tjarnir (av)	1	0,01	<1
Samtals ógróíð land	83	0,83	11
Alls	743	7,43	100

Hrísey

Gróðurlendakort


Skýringar

Gróðurlendi

- Mólandi
- Graslendi
- Alaskalúpina
- Ætíhvönn
- Skógarkerfill
- Annað blómlendi
- Ræktað land; garðar, tún og uppgræðsla
- Ræktað land; skógrækt
- Votlendi


Landgerð

- Byggð og önnur mannvirki
- Annað lítt eða ógróð land
- Vatn/tjarnir



Gróðurlendi og landgerðir 2007

ha, % eyjar



Hrísey

Gróðurlendakort


Skýringar

Gróðurlendi

- Mólandi
- Graslendi
- Alaskalúpina
- Ætíhvönn
- Skógarkerfill
- Annað blómlendi
- Ræktað land; garðar, tún og uppgræðsla
- Ræktað land; skógrækt
- Votlendi

Landgerð

- Byggð og önnur mannvirkni
- Annað lítt eða ógróð land
- Vatn/tjarnir



Útbreiðsla alaskalúpínu
í Hrísey 1998 og 2007

Skýringar

-  1998
-  Aukning til 2007
-  Lúpinublettir í öðru gróðurlendi
-  Mörk annarra gróðurfélaga

0 0,5 km



Útbreiðsla skógarkerfils og ætihvannar
í Hrísey 1998 og 2007

Skýringar

- Skógarkerfill 1998
- Aukning í útbreiðslu skógarkerfils til 2007
- Ætihvönn 1998
- Aukning í útbreiðslu ætihvannar til 2007
- Ætihvannarblettir í öðru gróðurlendi
- Mörk annarra gróðurfélaga

0 0,5 km



Útbreiðsla hávaxinna og breiðumyndandi plantna
í Hrísey 1998

Skýringar

- Hávaxnar breiðumyndandi plöntur
- Mörk annarra gróðurfélaga

0 0,5 km



Útbreiðsla hávaxinna og breiðumyndandi plantna
í Hrísey 2007

Skýringar

- Hávaxnar breiðumyndandi plöntur
- Mörk annarra gróðurfélaga

0 0,5 km



Fuglavarp í Hrísey

- 40 tegundir varpfugla -
- Mólendið mikilvægt búsvæði fyrir mófugla
 - heiðlóa, spói, hrossagaukur, þúfuttlingur, skógarpröstur, rjúpa
- Opna landið einnig mikilvægt f. sjófugla
 - æðarfugl, kría
- Votlendi (30 ha) mikilvægt f. endur og vaðfugla
 - stökkönd, rauðhöfði, jaðrakan

Rjúpnavarp

- Karrar taldir árlega
 - 1963-1977
 - frá 1983
- Eitt þéttasta varp sem þekkt er
 - 270 karrar 1986



2. mynd. Óðalskarrar á lífi í Hrísey um miðjan maí 1966, 1967, 1971 og 1975. Glögglega sést munur á hámarks- og lágmarksárum rjúpunnar.












Hvert stefnir?



1. mynd. Líklegur vöxtur í útbreiðslu alaskalúpínu, skógarkerfils og ætíhvannar í Hrísey frá 1963, byggt á mælingum á loftmyndum frá 1976, 1998 og 2007. Gildi fyrir árin 1980 og 1990 eru ágiskanir. Lúpínu var fyrst sáð í eyjunni árið 1963 og þá var hvannafræi einnig sáð við tjarnir í landi Ystabæjar.

Hrísey - meginatriði

- Hrísey einkennist af víðáttumiklu mólendi
- Úbreiðsla lúpínu, skógarkerfis og hvannar ógn við líffræðilega fjölbreytni í eyggi
- Eyjan undirlögð innan 50 ára
- Hefta ber útbreiðslu, stöðugar aðgerðir nauðsynlegar til framtíðar, fella inn í almenn verk
- Standa ber vörð um fjölbreytni fugla og búsvæði þeirra í eyggi
- Viðhalda opnu landi, takmarka skógrækt

Aðgerðir

- Mikilvægt að bíða ekki með aðgerðir
- Vandí vex með hverju ári
- Aðgerðir gegn framandi tegundum þarf að fella inn í árlegar, fastar aðgerðir sem unnar eru á útivistarsvæðum
- Fela sömu aðilum umsjón verka ár eftir ár, byggja upp þekkingu og reynslu

Aðgerðir gegn lúpínu/kerfli

- Sláttur, reiting
- Endurvekja sauðfjárbreit
- Setja markalínur, halda plöntum frá suðurhluta eyjar?

Sláttur

- Lúpína er viðkvæm fyrir slætti
- Sláttutími skiptir miklu máli
- Kemur aftur upp af fræforða
- Kerfill þolir slátt betur en lætur undan við endurtekin slátt

Áhrif sláttar á lúpínu, á mismunandi tíma sumars

10-14. ljósmynd.


Endurvöxtur lúpínu eftir slátt á Korpu á mismunandi tímum sumarið 1987. Myndirnar eru teknar 21. júní 1989, um tveimur árum eftir slátt.

Photo 10-14. Regrowth of *Nootka lupine* after cutting at different times in the summer of 1987. The photos are taken two years later, on June 21, 1989.

10. ljósmynd.

Sláttutími 1. júní. Plöntur hafa orðið fyrir litlum áhrifum af slætti og vaxið upp að nýju.


Photo 10. Cutting on June 1. Effects of the cutting are not apparent, plants recover.



11. ljósmynd.

Sláttutími 22. júní. Talsverð áhrif af slætti, meiri hluti plantna hefur drepist. Ungplöntur eru hins vegar teknar að vaxa upp af fræi innan um grösín.

Photo 11. Cutting on June 22. Majority of the old plants have died. Among the grasses young plants are regenerating from seeds.



12. ljósmynd.

Sláttutími 13. júlí. Mikil áhrif af slætti, nær allar plöntur hafa drepist. Ungplöntur í sverði að vaxa upp af fræi.


Photo 12. Cutting on July 13. Most of the old plants have died but regeneration is occurring from seeds.



13. ljósmynd.

Sláttutími 6. ágúst. Fremur lítil áhrif af slætti, um helmingur plantna virðist hafa vaxið upp að nýju.

Photo 13. Cutting on August 6. Rather little effects of the cutting, about half of the old plants have recovered.



14. ljósmynd.

Sláttutími 26. ágúst. Lítil sem engin áhrif af slætti, plöntur hafa vaxið upp að nýju.

Photo 14. Cutting on August 26. No apparent effects after cutting, plants have recovered.

- Sláttur fari fram 20. júní – 15. júlí, lúpína í háblóma
- Slá niður við jörð

Búfjárbætt

- Kemur til álita á völdum, afmörkuðum svæðum
- Eyjar, hólmar, girðingar
- Er víða bætt erlendis til að viðhalda fjölbreyttu gróðurfari og halda niðri ágengum tegundum
- Viðhalda hóflegri bætt á landi sem enn er nýtt til beitar í bæjarlöndum

Minn tími mun koma !

12

FRÉTTABLAÐIÐ

13. október 2009 ÞRIÐJUDAGUR

Ísafjarðarbær gerir tilraun með að nota kindur og hesta til að slá gras í bænum

Beita húsdýrum á hringtorgir

NÁTTÚRUVERND Ísafjarðarbær mun gera tilraun með að beita húsdýrum á lítið notuð græn svæði í bænum næsta sumar. Ralf Trylla, umhverfisfulltrúi Ísafjarðarbæjar, segir mögulegt að lækka kostnað við slátt, auk þess sem húsdýrin séu á allan hátt umhverfisvænni en sláttuvélarnar.

„Einhver þarf að slá grasið, og dýrin gera það vistvænt og fyrir lítið fé, og svo bera þau auðvitað sjálf á blettinn,“ segir Ralf. Hann segir að líklega verði það einkum kindur og hestar sem verði fyrir valinu. Svæðin sem þau fá til beit- ar verði væntanlega girt af tíma- bundið með rafmagnsgirðingum.



UMHVERFISVÆN Búast má við að umhverfisvænar sláttuvélar eins og kindur og hestar verði aðdráttarafli fyrir fjölskyldufólk og jafnvel ferðamenn.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Í raun er hægt að prófa þessa aðferð á flestum svæðum sem eru notuð lítið eða óreglulega, allt frá

opnum svæðum í útjaðri bæjar til hringtorga, segir Ralf. Þó sé staklega áhugavert að beita kind á svæði þar sem kerfill sé til vandræða, enda sé jurtin skæða ekk vandræða á túnum þar sem kin gangi lausar.

Ekki spillir fyrir að dýrin g orðið vinsæl hjá fjölskyldu gönguferð, segir Ralf. Í framh- inu mætti skoða kerfi þar sem le eigendur geti leigt kind eða ki ur til að sleppa við að slá blett. Eftir er að skoða ýmsa þætti dæmis hvernig brugðist verði sleppi dýrin úr girðingu, hve mörg dýr þurfi á hvert tún o hversu langan tíma.

Stykkishólmur


- Ný úttekt á ástandi og tillögur um mótvægisaðgerðir
- Unnar af Náttúrustofu Vesturlands
- Mjög vönduð skýrsla og nýstárleg tök

Ágengar plöntur í Stykkishólmi


Útbreiðsla Alaskalúpínu, skógarkerfils, Spánarkerfils og bjarnarklóar
og tillögur um mótvægisaðgerðir








4. mynd. Rannsóknin náði yfir land Stykkishólmsbæjar (gult), þó ekki eyjar sem tilheyra sveitarfélaginu. Kort birt með leyfi Landmælinga Íslands.



5. mynd. Útbreiðsla lúpinu (grænt), skógarkerfils (fjólublátt), Spánarkerfils (blátt) og bjarnarklóar (rautt) í landi Stykkishólmsbæjar. Hver punktur táknar fundarstað og stærð punktsins segir til um stærðarflokk breiðunnar. Kort birt með leyfi Landmælinga Íslands.



10. mynd. Útbreiðsla lúpinu í Stykkishólmi (grænir punktar) og 70% þungamiðjur dreifingar plantnanna (grænar línur). Bókstafir vísa til tillagna að forgangsröðun aðgerða (sjá texta á bls. 22). Kort birt með leyfi Landmælinga Íslands.